

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH w sadach

1. Próbkę pobiera się z warstwy ornej 0 - 20 i podornej 20 - 40 cm.
2. Jeśli ziemia utrzymywana jest jako ugór herbicydowy w rzędach i murawa w międzyrzędach, próbki pobiera się oddzielnie spod ugoru i spod murawy.
3. Próbkę pobiera się laską Egnera lub szpadlem po przekątnej pola lub zygzakiem z rzędów (ok. 40 cm od środka karpny) i międzyrzędzi na przemian.
4. Pobrać należy 30 - 40 próbek pierwotnych - oddzielnie z warstwy ornej i podornej z powierzchni do 3 ha.
5. Powierzchnie większe i o zmienności glebowej należy podzielić.
6. Próbkę można pobierać w różnych okresach, najlepiej wiosną, przed wysiewem nawozów (zwykle jednak pobiera się wraz z poborem próbek liści tj. od 15 lipca do 15 sierpnia).
7. Do próbki średniej o masie ok. 0,5 kg należy dołączyć etykietę i szkic pola.
8. Próbkę tak opisaną wraz ze szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio lub pocztą do Stacji Chemiczno-Rolniczej albo przekazać pracownikowi terenowemu SCHR.